



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека



ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Клещевые инфекции

Моноцитарный эрлихиоз
человека (МЭЧ)

Гранулоцитарный анаплазмоз
человека (ГАЧ)

Клещевые инфекции

Клещевые инфекции – это инфекционные заболевания, передаваемые при присасывании клеща. Во время присасывания микроорганизмы со слюной попадают в кровоток человека и чем дольше клещ остается на теле хозяина, тем выше вероятность заражения.

Основными переносчиками являются клещи рода *Ixodes*, менее значимыми являются клещи родов *Haemophysalis* и *Dermacentor*. Для всех клещевых инфекций характерна весенне-осенняя сезонность (апрель-октябрь), что связано с их высокой активностью.

Такие инфекции, как клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), на слуху у многих. Однако клещи могут быть переносчиками и других инфекций, которые были открыты сравнительно недавно.

Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) – бактериальная инфекция, вызываемая внутриклеточными микроорганизмами рода Эрлихия. Протекает под видом острого лихорадочного заболевания. Поражаются различные органы, такие как кожа, печень, нервная система и костный мозг. Не исключено, что течение заболевания может быть хроническим. *Инкубационный период* длится 1–21 день.

Заболевание начинается остро с появления лихорадки, чувства усталости, головной боли, мышечной боли и других симптомов интоксикации.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) - острое лихорадочное заболевание с трансмиссивным путем передачи и разнообразной клинической картиной.

Возбудителем является *Anaplasma phagocytophilum*, которая попадает в кровь со слюной клеща, разносится по организму и вызывает воспаления внутренних органов. При проникновении и размножении возбудителя ГАЧ в лейкоцитах отмечается снижение иммунитета.

Инкубационный период составляет 3-23 дня (в среднем 2 недели).

Для ГАЧ характерно острое начало заболевания с подъемом температуры до высоких цифр, который может длиться от 2 до 10 дней. Также появляется слабость, головная и мышечная боль. Может снижаться артериальное давление, появляются головокружения, тошнота и сердцебиение.



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru

В связи с тем, что у данных заболеваний отсутствуют характерные симптомы, диагностика часто затруднена. Также в связи с единым механизмом передачи клещевых инфекций не исключено попадание в организм различных микробов одновременно.

В лаборатории по индикации ООИ и ПЦР проводятся исследования клещей, снятых с людей на в том числе на МЭЧ, ГАЧ методом ПЦР.

Стоимость исследования клещей определяется действующим прейскурантом и составляет:

Исследование клещей на **одну** инфекцию:

На клещевой энцефалит **348 Р**

На боррелиоз (болезнь Лайма) **504 Р**

Исследование клещей на **две** инфекции:

На клещевой энцефалит и
боррелиоз (болезнь Лайма) **852 Р**

Комплексное исследование клещей на **четыре** инфекции:

На моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ)

Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ)

На клещевой энцефалит

На боррелиоз (болезнь Лайма) **1680 Р**



02.fbuz



vk.com/sesufa


sesufa.ru

Социальные сети


Центра гигиены и эпидемиологии



sesufa.ru



vk.com/sesufa



02.fbuz



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru